

## Kijkonderzoek in de longen met roesje

### Bronchoscopie / echo-bronchoscopie

Na overleg met uw arts is besloten tot kijkonderzoek van de longen mét een roesje. Het onderzoek vindt plaats op de Functieafdeling van de longen op niveau 2 (volg route G, groen). Bij een bronchoscopie of echo-bronchoscopie kijkt de arts met een dunne flexibele slang in uw longen of hij afwijkingen ziet. Het onderzoek doet geen pijn en u kunt na het onderzoek en een korte observatie weer naar huis. Hieronder staat aangekruist welke van de twee onderzoeken bij u wordt gedaan.

#### **Vorbereiding**

De nacht vóór het onderzoek mag u na 24.00 uur niet meer eten, drinken en roken. U moet het onderzoek volledig nuchter ondergaan. Kies voor kleding die niet te strak in de hals zit. Vraag aan uw behandelend arts of u de medicijnen die u heeft, mag blijven gebruiken voorafgaand aan het onderzoek. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, geef dit dan door aan de arts die het onderzoek doet. Geef het ook aan als u diabetespatiënt bent. We plannen dan speciaal voor u zo vroeg mogelijk een afspraak. Overleg met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten. Deze voorbereiding geldt voor beide onderzoeken.



1: met een dunne, flexibele slang wordt in uw longen gekeken

- **Bronchoscopie**  
Bij een bronchoscopie kijkt een arts met een dunne flexibele slang in uw longen. Het onderzoek is op geen enkel moment pijnlijk en duurt ongeveer twintig minuten. Tijdens het onderzoek bekijkt de arts de binnenkant van uw longen. Een eventueel kunstgebit moet u even uit doen. Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen. U komt op uw rug op een onderzoekstafel te liggen. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten. Vlak voor het onderzoek zal de arts nog een infuus bij u aanleggen. Hiermee wordt een slaapmiddel ('roesje') toegediend, dat u helpt te ontspannen.
- **Echo-bronchoscopie** Tijdens dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van echogolven voor de exacte plaatsbepaling. Hier merkt u niks van! Er wordt een flexibele slang via de mond ingebracht door de arts. Een eventueel kunstgebit moet u even uit doen. Daarna wordt uw keel verdoofd met een verdovingsvloeistof of spray. Tijdens de verdoving en het onderzoek kunt u gewoon rustig blijven ademen. U komt op uw rug op een onderzoekstafel te liggen. Verder krijgt u een bijtring tussen de kaken om de scoop te beschermen. Het zuurstofgehalte en uw polsslag worden voortdurend gemeten. Vlak voor het onderzoek zal de arts nog een infuus bij u aanleggen. Hiermee wordt een slaapmiddel ('roesje') toegediend, dat u helpt te ontspannen.

## Na het onderzoek (bronchoscopie of echo-bronchoscopie)

Omdat u een slaapmiddel (roesje) heeft gekregen, verblijft u na het onderzoek twee uur op verpleegafdeling A3 of op het Dagcentrum ter observatie. Hierna kunt u gewoon naar huis. We adviseren iedereen dringend om na afloop niet zelf meer aan het verkeer deel te nemen. Neem een begeleider mee of kom met een taxi of het openbaar vervoer. Na een roesje en de lichte verdoving mag je 24 uur na afloop van het onderzoek niet meer rijden. Kijk ook uit met het bedienen van machines en andere zaken die concentratie vragen. Alcohol of andere genotmiddelen mogen 24 uur na het innemen van het slaapmiddel niet meer gebruikt worden. Na de bronchoscopie mag u twee uur niets meer eten of drinken om te voorkomen dat u zich verslikt. Door het onderzoek kan uw keel wat gevoelig zijn en kunt u tijdelijk hees worden. Dit duurt gelukkig nooit lang. In het geval u opgenomen bent in het ziekenhuis, gaat u na het onderzoek gewoon weer naar uw verpleegafdeling.

## Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie of echo-bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Wanneer er zich na het onderzoek toch bijzonderheden voordoen, neemt u contact op met de Longafdeling (T 043 - 387 65 43). Vraag dan naar de dienstdoende longarts. Doe dit met name als u na het onderzoek één of meer van de volgende klachten heeft:

- koorts (een temperatuur hoger dan 38,5 ° C) en/of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek
- kortademigheid
- bloed opgeven
- pijn

## Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de Functieafdeling van de longen. Doen er zich na het onderzoek problemen voor, bel dan tijdens kantooruren met de Longafdeling (verpleegafdeling A3). 's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u met de Spoed Eisende Hulp. Vraag dan naar de dienstdoende longarts.

Functieafdeling van de longen: 043 - 387 52 25

Longafdeling: 043 - 387 65 43

Spoed Eisende Hulp: 043 - 387 67 00

Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing? Dan kunt u contact opnemen met uw specialist. Geef het zo spoedig mogelijk door aan de Functieafdeling van de longen als u bent verhinderd voor uw afspraak. Voor vragen zijn wij van maandag van 8.00 tot 17.00 bereikbaar via telefoonnummer 043 – 387 7225.

## Websites

- [www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)

*Odin 032654 / uitgave: september 2014*

Bezoekadres  
P. Debyelaan 25  
6229 HX Maastricht

Postadres  
Postbus 5800  
6202 AZ Maastricht

Algemeen telefoonnummer  
043-387 65 43  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)